

消化系統疾病


大腸內視鏡 Colonoscopy

一般人認為做大腸鏡是一個很可怕、痛苦的檢查，但事實並不如此。

這項檢查是用類似胃鏡的軟管由肛門進入腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升直腸，最後到達盲腸而完成整個檢查。大腸鏡是檢查大疾病最精確的診斷工具，透過螢幕，醫生可以清楚觀察極微小的病變，並且取組織化驗。對於瘻肉或早期腸癌，也能用大腸鏡直接切除，避免日後轉變成侵犯性大腸癌，而必須進行手術治療。

檢查過程

- 檢查過程中，將會注入少許空氣，以觀察腸壁狀況。
- 病變的地方會視乎病情需要，可經由內視鏡提取樣本作切片檢查或瘻肉切除，這些操作並不會引起疼痛。
- 檢查時間視乎病情需要、大腸是否乾淨及病者是否合作而定，一般30分鐘1小時內完成。



為甚麼要做大腸鏡

痔瘡依據痔瘡發生的類型及部位而有所不同，當然並不是所有的痔瘡都一定會有徵狀。事實上，無症狀的痔瘡患者佔大多數：

- 不明原因的腹痛、腹脹。
- 大便習慣改變、慢性腹瀉。
- 大便出血、大便潛血陽性反應、貧血。
- 慢性潰瘍性結腸炎患者。
- 過去病歷有大腸癌或瘻肉，需要定期檢查。
- 有大腸癌或瘻肉家族歷史。

檢查後注意事項

- 腹脹疼痛現象，在手術後排氣後都會改善。
- 檢查後如無不適，便可如常飲食。
- 多喝開水。
- 如有腹痛不適，應立即到醫院就診，住院患者則應立即告知醫護人員。
- 瘻肉切除術在手術後的一週內，少部分受檢者會有腸道出血或穿孔，如有出血或急性腹痛，請通知醫生。

檢查前準備

為清除腸內殘留糞便，以免干擾腸內之觀察，所以需做排空糞便之準備。

- 檢查前2天，採低渣飲食。(盡量避免高纖食物，如蔬菜水果)
- 檢查前1天，採清淡流質飲食(稀飯、牛奶等)，並於晚餐後服用瀉藥及大量開水。
- 若是住院病人，在檢查當天早晨還會給予灌腸藥，確定大腸已經乾淨沒有糞便。
- 如檢查安排在下午，早餐可吃清淡飲食，如牛奶、水等，午餐則禁止進食。

檢查報告

- 醫生會即時告知檢查結果。如取組織化驗，須要3至5天才會有報告。



明心醫務中心有限公司
ActiveCareMedics Limited

電話：2311 2838 傳真：3020 8797
電郵：ACM@ActiveCareGroup.com
網址：www.ActiveCareGroup.com